

GEBRAUCHSINFORMATION

HEXIDIN „GENERICON“ Lutschtabletten

Wirkstoff: Chlorhexidingluconat

Z.Nr.:
7-00641

Zusammensetzung: Was ist in Hexidin „Genericon“-Lutschtabletten enthalten?

1 Lutschtablette enthält:

Chlorhexidingluconat	2 mg
Sorbit	644 mg
Aspartam	8 mg
Maisstärke	30 mg
Magnesiumstearat	10 mg
Pfefferminzaroma	
Farbstoffe E 104, E 131	

Arzneiform:
Lutschtabletten

Packungsgröße:
20 Stück

Pharmazeutisch-therapeutische Kategorie und Wirkungsweise: Wie wirken Hexidin „Genericon“-Lutschtabletten?

Hexidin „Genericon“ Lutschtabletten sind ein Mund- und Rachen-Antiseptikum mit breitem Wirkungsspektrum und Langzeitwirkung.

Hexidin „Genericon“ Lutschtabletten wirken gegen Bakterien- und gegen Pilzinfektionen. Aufgrund der langen Verweildauer der Lutschtabletten im Mund kann ein hoher Grad an Wirksamkeit erzielt werden. Durch Bakterien verursachte Entzündungen und Mundgeruch werden nachhaltig verhindert.

Hexidin „Genericon“ Lutschtabletten beschleunigen die Wundheilung bei Verletzungen und beugen einer eventuellen Bakteriämie vor. Sie sind bei vorschriftsmäßiger Anwendung gut schleimhautverträglich. Der Wirkstoff Chlorhexidingluconat hat eine starke Affinität zur Schleimhautoberfläche, sodaß es sich in vielen Fällen auch noch nach 24 Stunden nachweisen läßt.

Aufgrund der Zuckergefreiheit schaden Hexidin „Genericon“ Lutschtabletten den Zähnen nicht und sind auch für Diabetiker geeignet.

Zulassungsinhaber und Hersteller:
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., A-8054 Graz
genericon@genericon.at; www.genericon.at

Anwendungsgebiete: Wann werden Hexidin „Genericon“-Lutschtabletten eingenommen?

Katarrhe im Mund- und Rachenraum

Gegenanzeigen: Wann dürfen Hexidin „Genericon“-Lutschtabletten nicht angewendet werden?

- Bekannte Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Präparates.
- Phenylketonurie (wegen des Phenylalaningehaltes)

Die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillperiode ist möglich.

Besondere Warnhinweise: Welche Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Hexidin „Genericon“ Lutschtabletten sollten nicht länger als 4 Wochen ohne ärztliche oder zahnärztliche Empfehlung ohne Unterbrechung angewandt werden, da sich bei längerer Anwendungsdauer Verfärbung der Zunge und Zähne sowie Geschmacksirritationen einstellen können. Hexidin „Genericon“ Lutschtabletten sollte nicht auf Dauer die normale Mundpflege ersetzen. In bestimmten Fällen jedoch z.B. bei der Intensivpflege, bei manuell Behinderten, können diese Nebenwirkungen bei Langzeitanwendung nach Maßgabe des behandelnden Arztes oder Zahnarztes in Kauf genommen werden.

Bei Fortbestand der Beschwerden, oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ehestens ärztliche (zahnärztliche) Beratung erforderlich.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren

Wechselwirkungen: Dürfen Hexidin „Genericon“-Lutschtabletten gleichzeitig mit anderen Mitteln eingenommen werden?

Es sind keine Wechselwirkungen bei gleichzeitiger Einnahme von Hexidin „Genericon“-Lutschtabletten mit anderen Mitteln bekannt.

Dosierung: Wann und wie lange nehmen Sie Hexidin „Genericon“-Lutschtabletten ein?

3 - 4 mal täglich 1 Tablette nach den Mahlzeiten langsam lutschen. Die Lutschpause zwischen 2 Tabletten sollte mindestens 2 Stunden betragen. Die Anwendung sollte 2 - 3 Tage lang nach Besserung der Beschwerden weiter erfolgen.

Art der Anwendung: Wie wenden Sie Hexidin „Genericon“-Lutschtabletten an?

Man lässt die Hexidin „Genericon“ Lutschtabletten einfach auf der Zunge zergehen. Die beste Wirkung kann erzielt werden, wenn 1-2 Stunden nach der Anwendung auf Essen und Trinken verzichtet wird.

Nebenwirkungen: Welche unerwünschten Wirkungen können bei der Einnahme von Hexidin „Genericon“-Lutschtabletten auftreten?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Hinweis auf Verfalldatum und Lagerung: Wie sollen Sie Hexidin „Genericon“-Lutschtabletten aufbewahren?

Verfalldatum beachten. Trocken aufbewahren.
Nicht über 25°C lagern. Lichtschutz erforderlich.

Stand der Gebrauchsinformation:
November 2001

BEI UNKLARHEITEN FACHLICHE BERATUNG EINHOLEN