

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Finasterid Genericon 5 mg filmom obložene tablete finasterid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Finasterid Genericon i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Finasterid Genericon
3. Kako uzimati Finasterid Genericon
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Finasterid Genericon
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Finasterid Genericon i za što se koristi

Finasterid Genericon pripada skupini lijekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze. Djelatna tvar u lijeku je finasterid, koji djeluje tako što se veže za enzim 5-alfa-reduktazu te tako sprječava stvaranje tvari uključene u rast prostate. Posljedica toga je zaustavljanje daljnjeg povećanja prostate. Dugotrajno uzimanje Finasterid Genericon često smanjuje veličinu prostate.

Zašto Vam je liječnik propisao Finasterid Genericon

Finasterid je specifični inhibitor enzima i primjenjuje se u liječenju muškaraca s dobroćudnim povećanjem prostate (benignom hiperplazijom prostate - BHP). Finasterid Genericon smanjuje povećanu prostatu i ublažava mokraćne simptome. Finasterid Genericon će pomoći smanjiti rizik od razvoja iznenadne nemogućnosti mokrenja (akutne urinarne retencije) i potrebu za operacijom.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Finasterid Genericon

Nemojte uzimati Finasterid Genericon:

- ako ste alergični na finasterid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Stanje za koje se propisuje Finasterid Genericon javlja se samo u muškaraca. Žene i djeca ne smiju uzimati Finasterid Genericon.

Što morate znati prije i tijekom uzimanja Finasterid Genericon

Ako je Vaša spolna partnerica trudna ili bi mogla biti trudna, morate izbjegavati izlagati je svome sjemenu koje može sadržavati male količine lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Finasterid Genericon:

- ako imate ili ste imali alergijsku reakciju.
- ako radite PSA test, koji se provodi radi otkrivanja tumora prostate, obavijestite Vašeg liječnika da uzimate Finasterid Genericon, jer Finasterid Genericon može utjecati na rezultat PSA testa u krvi.

- ako bolujete ili ste bolovali od bolesti jetre. Ne preporučuje se primjena Finasterid Genericonu u bolesnika sa zatajivanjem jetre.

Morate redovito posjećivati liječnika radi periodičke kontrole i procjene napretka u liječenju.

Promjene raspoloženja i depresija

U bolesnika liječenih lijekom Finasterid Genericon prijavljene su promjene raspoloženja kao što su depresivno raspoloženje, depresija i, manje često, misli o samoubojstvu. Ako se pojavi bilo koji od tih simptoma, obratite se liječniku za savjet što je prije moguće.

Molimo Vas da potražite savjet liječnika ako se nešto od gore navedenog odnosi ili se ikad prije odnosilo na Vas.

Drugi lijekovi i Finasterid Genericon

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Finasterid Genericon se općenito može uzimati zajedno s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Finasterid Genericon je namijenjen isključivo za liječenje dobroćudnog povećanja prostate u muškaraca. Trudnice ili žene koje bi mogle biti trudne ne smiju uzimati Finasterid Genericon i ne smiju rukovati smrvljenim ili slomljenim Finasterid Genericon tabletama. Ako se djelatna tvar u Finasterid Genericonu apsorbira nakon uzimanja kroz usta ili preko kože trudnice koja nosi muško dijete, finasterid kojem to dijete može biti izloženo prije rođenja može narušiti normalni razvoj njegovih spolnih organa. Ako trudnica dođe u kontakt s djelatnom tvari u Finasterid Genericonu, potrebno je potražiti savjet liječnika. Finasterid Genericon tablete obložene su filmom koji sprječava kontakt s djelatnom tvari tijekom normalnog rukovanja tabletama, pod uvjetom da tablete nisu slomljene ili zdrobljene.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka koji bi ukazivali na to da primjena Finasterid Genericonu može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

Finasterid Genericon sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Finasterid Genericon sadrži natrij.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Finasterid Genericon

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta Finasterid Genericonu svakog dana.

Uzmite jednu tabletu Finasterid Genericonu svaki dan s hranom ili bez nje.

Liječnik će Vam reći koliko dugo trebate uzimati Finasterid Genericon.

Ne zaboravite da je Vašoj prostati trebalo mnogo godina da naraste toliko da Vam prouzroči simptome. Finasterid Genericon može ublažiti simptome koje imate i kontrolirati bolest samo ako ga nastavite uzimati tijekom dugog razdoblja.

Liječnik Vam može propisati Finasterid Genericon u kombinaciji s drugim lijekom koji se zove doksazosin. To može pridonijeti boljoj kontroli dobroćudnog povećanja prostate.

Ako imate dojam da je učinak Finasterid Genericona prejak ili preslab, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više Finasterid Genericona nego što ste trebali

Uzmete li dozu koja je viša od propisane, ne preporučuje se posebno liječenje. Obratite se liječniku za savjet.

Ako ste zaboravili uzeti Finasterid Genericon

Uzimajte Finasterid Genericon kako je propisano. Međutim, propustite li uzeti dozu, nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Samo uzmite sljedeću tabletu prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati Finasterid Genericon

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prekinite uzimanje Finasterid Genericona i odmah se obratite liječniku ako uočite bilo koji od sljedećih simptoma (angioedem): oticanje lica, jezika ili grla; otežano gutanje; koprivnjača i otežano disanje.

Druge moguće nuspojave:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- smanjenje spolnog nagona ili smanjena spolna želja
- impotencija (nesposobnost postizanja erekcije)

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- promjene ili tegobe pri izbacivanju sjemena, kao što je smanjena količina sjemena koja se oslobađa kod spolnog odnosa
- oticanje i/ili osjetljivost dojki
- osip

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- alergijske reakcije kao što je oticanje usana, jezika, grla i lica
- depresija
- smanjenje spolnog nagona koje se nastavilo i nakon prestanka uzimanja lijeka
- osjećaj lupanja srca
- povišene vrijednosti jetrenih enzima
- svrbež, koprivnjača
- bol u testisima
- krv u sjemenu
- tegobe pri izbacivanju sjemena koje su se nastavile nakon prestanka uzimanja lijeka
- nemogućnost postizanja erekcije koja se nastavila nakon prestanka uzimanja lijeka
- neplodnost i/ili slaba kakvoća sjemena. Nakon prestanka uzimanja lijeka prijavljeno je poboljšanje kakvoće sjemena.
- tjeskoba

U rijetkim je slučajevima prijavljen rak dojke u muškaraca.

Odmah morate prijaviti liječniku sve promjene na dojčkama kao što su kvržice, bol ili iscjedak iz bradavice. Odmah obavijestite liječnika ili ljekarnika o ovim ili bilo kojim drugim neuobičajenim simptomima jer to mogu biti znakovi ozbiljne bolesti kao što je rak dojke.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#). Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Finasterid Genericon

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom i unutarnjem pakiranju iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Finasterid Genericon sadrži

Djelatna tvar je finasterid.

1 filmom obložena tableta sadrži 5 mg finasterida.

Pomoćne tvari su:

Laktoza hidrat; natrijev laurilsulfat; škrob, prethodno geliran; celuloza, mikrokristalična; natrijev škroboglikolat (vrste A); magnezijev stearat; hipromeloza; makrogolstearat.

Kako Finasterid Genericon izgleda i sadržaj pakiranja

Filmom obložena tableta za primjenu kroz usta.

Finasterid Genericon 5 mg filmom obložene tablete su bijele, okrugle, bikonveksne, s utisnutim “F” i “5” na jednoj strani, promjera 7 mm.

Finasterid Genericon 5 mg je dostupan u pakiranju od 30 filmom obloženih tableta u PVC/PVDC aluminijskom blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

Hafnerstrasse 211, 8054 Graz

Austrija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Genericon Pharma d.o.o.

Nova Ves 17

10000 Zagreb

Tel: 01 4669322

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 04. veljače 2021.